

nombre del paciente: _____

| su medicación | | | | próximas citas | |
|---------------|---|---|---|---|--|
| medicamento |  |  |  |  |  |
| | | | | / / | |
| | | | | / / | |
| | | | | / / | |
| | | | | / / | |
| | | | | / / | |
| | | | | / / | |

Más información sobre sus medicamentos en www.medicamentosdehospital.es

Recuerde:

- No tome medicamentos por su cuenta, sin las indicaciones de su médico.
- Consulte al personal sanitario que lo atiende las dudas que puedan surgirle a lo largo del tratamiento.
- Sus medicamentos son adecuados únicamente para Ud. no los recomiende a otras personas.
- Cuando finalice el tratamiento devuelva la medicación sobrante en el Servicio de Farmacia.

Centro de información de medicamentos:

Este proyecto ha sido financiado a cargo de los fondos para la cohesión territorial 2008 del Ministerio de Sanidad y Consumo que fueron aprobados en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud de fecha 12 de diciembre de 2007, como apoyo a la implementación a la Estrategia en Seguridad del Paciente del Sistema Nacional de Salud.



Epivir® (lamivudina)



¿Qué es?

Epivir® es lamivudina, un inhibidor de la transcriptasa inversa análogo de nucleósido que juntos disminuyen la multiplicación del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH).

Se utiliza siempre en asociación con otros medicamentos antirretrovirales.

Aunque retrasa la progresión de la enfermedad, no evita el riesgo de transmisión de la infección, por ello debe tomar las precauciones necesarias para evitar contagiar a otras personas.

¿Cómo se administra?

Puede tomarlo con o sin comida. Cumpla rigurosamente la dosificación indicada por su médico.

Dada la elevada velocidad de multiplicación del virus, cualquier período sin niveles adecuados del fármaco podría condicionar la aparición de resistencias y comprometer su eficacia.

¿Cómo se conserva?

A temperatura ambiente, alejado de la humedad, del calor y la luz.

Efectos secundarios

Este medicamento puede producir náuseas, vómitos, diarrea, tos, erupción, alopecia, insomnio, dolor de cabeza, cansancio, entumecimiento y hormigueo en pies y manos. Algunos síntomas suelen mejorar al cabo de unas semanas de tratamiento; si persisten o se agravan comuníquelo a su médico.

Comunique lo antes posible a su médico o farmacéutico si aparecen los siguientes síntomas: náuseas, vómitos, dolor abdominal, pérdida de apetito o de peso, respiración profunda o debilidad muscular (posible acidosis láctica).

Comuníquelo a su médico o farmacéutico cualquier otro síntoma que crea pueda ser debido a este medicamento.

Su uso a largo plazo puede producir una distribución anormal de la grasa corporal.

Interacciones

Extremar las precauciones si se usa junto a cotrimoxazol a dosis elevadas.

Otras observaciones

Advierta a su médico si tiene antecedentes de enfermedad hepática, renal, anemia, pancreatitis o de reacción alérgica a lamivudina.