

# Combivir®

## (lamivudina/ zidovudina)



### ¿Qué es?

Combivir® es lamivudina + zidovudina, una asociación de dos inhibidores de la transcriptasa inversa análogos de nucleósidos que juntos disminuyen la multiplicación del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH).

Se utilizan siempre en asociación con otros medicamentos antirretrovirales.

Aunque retrasa la progresión de la enfermedad, no evita

el riesgo de transmisión de la infección, por ello debe tomar las precauciones necesarias para evitar contagiar a otras personas.

### ¿Cómo se administra?

Puede tomarlo con o sin comida. Cumpla rigurosamente la dosificación indicada por su médico.

Dada la elevada velocidad de multiplicación del virus, cualquier período sin niveles adecuados del fármaco podría condicionar la aparición de resistencias y comprometer su eficacia.

### ¿Cómo se conserva?

A temperatura ambiente, alejado de la humedad, del calor y la luz.

### Efectos secundarios

Este medicamento puede producir: náuseas, vómitos, diarrea, tos, erupción, alopecia insomnio, dolor de cabeza, cansancio, anemia o entumecimiento y hormigueo en pies y manos. Algunos síntomas suelen mejorar al cabo de unas semanas de tratamiento; si persisten o se agravan comuníquelo a su médico.

Comunique lo antes posible a su médico o farmacéutico si aparecen los siguientes síntomas: náuseas, vómitos, dolor abdominal, pérdida de apetito o de peso, respiración profunda o debilidad muscular (posible acidosis láctica).

Comunique a su médico o farmacéutico cualquier otro síntoma que crea pueda ser debido a este medicamento.

Su uso a largo plazo puede producir una distribución anormal de la grasa corporal.

### Interacciones

Extremar las precauciones si se usa junto a cotrimoxazol a dosis elevadas, interferón o rifampicina.

Si toma junto a claritromicina se debe espaciar la administración dos horas ya que se reduce la absorción de los antirretrovirales.

Este medicamento, si se toma junto a determinados fármacos, puede aumentar su toxicidad o disminuir su eficacia. Por esto, es importante que antes de tomar otros medicamentos consulte a su médico o farmacéutico.

### Otras observaciones

Advierta a su médico si tiene antecedentes de enfermedad hepática, renal, anemia, pancreatitis o de reacción alérgica a lamivudina o zidovudina