

# Aptivus® (tipranavir)

## ¿Qué es?

Aptivus® es tipranavir, un inhibidor de la proteasa que disminuye la multiplicación del Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH).

Se utiliza siempre en asociación con otros medicamentos antirretrovirales.

Aunque retrasa la progresión de la enfermedad, no evita el riesgo de transmisión de la infección, por ello debe tomar las precauciones necesarias para evitar contagiar a otras personas.

## ¿Cómo se administra?

Debe tomarse con comida o dentro de las 2 horas posteriores a la comida y siempre junto con Norvir®. Trague las cápsulas enteras y sin masticar con agua u otra bebida.

Si olvida tomar una dosis, tómela tan pronto pueda; a no ser que hayan pasado más de 12 horas, en cuyo caso espere a la siguiente dosis. No tome una dosis doble para compensar la olvidada.

Cumpla rigurosamente la dosificación indicada por su médico.

Dada la elevada velocidad de multiplicación del virus, cualquier período sin niveles adecuados del fármaco podría condicionar la aparición de resistencias y comprometer su eficacia.

## ¿Cómo se conserva?

Debe conservarse en nevera (entre 2° y 8°). Una vez abierto el frasco, escriba la fecha de apertura y utilícelo en un plazo de 60 días. Durante este tiempo puede conservarse a Tª ambiente (25°C).



## Efectos secundarios

Frecuentemente este medicamento puede producir diarrea y náuseas. También pueden darse vómitos, dolor abdominal, flatulencias, cansancio, dislipemia, alteraciones hepáticas y exantema cutáneo (éste último aumentado con el uso concomitante de anticonceptivos o estrógenos).

Ocasionalmente puede provocar daño hepático. Informe a su médico si usted nota síntomas clínicos como pérdida de apetito, náuseas, vómitos y/o ictericia (coloración amarilla en piel y ojos).

Su uso a largo plazo puede producir una distribución anormal de la grasa corporal (lipodistrofia).

Comuníquese a su médico o farmacéutico cualquier otro síntoma que crea pueda ser debido a este medicamento.

## Interacciones

Evitar su uso junto con cisaprida, amiodarona, ergotamina y derivados, lovastatina, pimozida, sertindol, quinidina, rifampicina, simvastatina, astemizol, terfenadina, tria-

zolam, flecainida, propafenona, quinidina o productos que contengan *Hypericum perforatum* (Hierba de San Juan).

Puede disminuir la eficacia de anticonceptivos orales (usar métodos alternativos) y de metadona (considerar aumentar la dosis). No se recomienda tomar Aptivus® junto con anticonceptivos orales o estrógenos.

Extremar la precaución si se usa junto a sildenafil, vardenafil o tadalafil, disulfiram, fluticasona, atorvastatina y metronidazol. Todos ellos pueden potenciar los efectos adversos de Aptivus®.

Este medicamento, si se toma junto a determinados fármacos, puede aumentar su toxicidad o disminuir su eficacia. Por esto, es importante que antes de tomar otros medicamentos consulte a su médico o farmacéutico.

## Otras observaciones

Advierta a su médico si tiene antecedentes de enfermedad hepática moderada o grave, hemofilia o de reacción alérgica a éste o a otros antirretrovirales.