

Emtriva® (emtricitabina)

¿Qué es?

Emtriva® es emtricitabina, un inhibidor de la transcriptasa inversa análogo de nucleósido que disminuye la multiplicación del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH).

Se utiliza siempre en asociación con otros medicamentos antirretrovirales.

Aunque retrasa la progresión de la enfermedad, no evita el riesgo de transmisión de la infección, por ello debe tomar las precauciones necesarias para evitar contagiar a otras personas.

¿Cómo se administra?

Puede tomarlo con o sin alimentos.

Si olvida tomar una dosis, tómela tan pronto pueda; a no ser que hayan pasado más de 12 horas, en cuyo caso espere a la siguiente dosis. No tome una dosis doble para compensar la olvidada.

Cumpla rigurosamente la dosificación indicada por su médico.

¿Cómo se conserva?

Las cápsulas duras se conservan a temperatura ambiente, alejado de la humedad, del calor y la luz.

La solución oral debe conservarse en nevera y desecharse 45 días después de su apertura.

Efectos secundarios

Este medicamento puede producir erupción en la piel, diarrea, náuseas, dolor de cabeza, anemia, oscurecimiento de la piel en las palmas o plantas del pie, dolor muscular y debilidad.

Algunos síntomas suelen mejorar al cabo de unas semanas de tratamiento; si persisten o se agravan comuníquelo a su médico.

Comunique lo antes posible a su médico si aparecen los siguientes síntomas: náuseas, vómitos, dolor abdominal, pérdida de apetito o de peso, respiración profunda o debilidad muscular (posible acidosis láctica).

Comunique a su médico o farmacéutico cualquier otro síntoma que crea pueda ser debido a este medicamento.

Interacciones

Este medicamento, si se toma junto a determinados fármacos, puede aumentar su toxicidad o disminuir su eficacia. Por esto, es importante que antes de tomar otros medicamentos consulte a su médico o farmacéutico.

Otras observaciones

Advierta a su médico si tiene antecedentes de enfermedad hepática, renal, anemia, pancreatitis o de reacción alérgica a lamivudina.