

Intelence® (etravirina)

¿Qué es?

Intelence® es etravirina, un inhibidor de la transcriptasa inversa no análogo de nucleósido que disminuye la multiplicación del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH).

Se utiliza siempre en asociación con otros medicamentos antirretrovirales.

Aunque retrasa la progresión de la enfermedad, no evita el riesgo de transmisión de la infección, por ello debe tomar las precauciones necesarias para evitar contagiar a otras personas.

¿Cómo se administra?

Debe tomarse con comida o dentro de las 2 horas posteriores a la comida. Si tiene dificultad para tragar puede disolver el comprimido en medio vaso de agua y luego beberse.

Si olvida tomar una dosis, tómela tan pronto pueda; a no ser que hayan pasado más de 6 horas, en cuyo caso espere a la siguiente dosis. No tome una dosis doble para compensar la olvidada.

Cumpla rigurosamente la dosificación indicada por su médico.

¿Cómo se conserva?

Las cápsulas duras se conservan a temperatura ambiente, alejado de la humedad, del calor y la luz.

La solución oral debe conservarse en nevera y desecharse 45 días después de su apertura.

Efectos secundarios

Este medicamento puede producir: erupción cutánea, náuseas, vómitos, diarrea y cansancio. Algunos síntomas suelen mejorar al cabo de unas semanas de tratamiento; si

persisten o se agravan comuníquelo a su médico.

Comunique lo antes posible a su médico si la erupción cutánea es muy intensa, afecta a amplias zonas o mucosas, o si presenta ampollas en labios, boca, garganta u ojos.

Su uso a largo plazo puede producir una distribución anormal de la grasa corporal (lipodistrofia).

Comunique a su médico o farmacéutico cualquier otro síntoma que crea pueda ser debido a este medicamento.

Comunique a su médico o farmacéutico cualquier otro síntoma que crea pueda ser debido a este medicamento.

Interacciones

Evite su uso junto a carbamazepina, claritromicina, dexametasona, efavirenz, fenitoina, fenobarbital,

nevirapina, rifampicina, tipranavir/ritonavir, o productos con Hypericum perforatum (Hierba de San Juan).

Úselo con precaución junto a ace-nocumarol, amiodarona, atorvastatina, ciclosporina, diazepam, digoxina, fluvastatina, fosamprenavir/ritonavir, itraconazol, ketoconazol, lovastatina, maraviroc, quinidina, simvastatina, sildenafil, sirolimus, tacrolimus, tadalafilo, vardenafilo o voriconazol.

Este medicamento, si se toma junto a determinados fármacos, puede aumentar su toxicidad o disminuir su eficacia. Por esto, es importante que antes de tomar otros medicamentos consulte a su médico o farmacéutico.

Otras observaciones

Advierta a su médico si tiene antecedentes de enfermedad hepática o de reacción alérgica a éste o a otros antirretrovirales.