

Invirase[®] (saquinavir)

¿Qué es?

Invirase[®] es saquinavir, un inhibidor de la proteasa que disminuye la multiplicación del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH).

Se utiliza siempre en asociación con otros medicamentos antirretrovirales.

Aunque retrasa la progresión de la enfermedad, no evita el riesgo de transmisión de la infección, por ello debe tomar las precauciones necesarias para evitar contagiar a otras personas.

¿Cómo se administra?

Los comprimidos deben tragarse enteros, con comida y siempre junto a Norvir[®].

Si olvida tomar una dosis, tómela tan pronto pueda; a no ser que hayan pasado más de 6 horas, en cuyo caso espere a la siguiente dosis. Cumpla rigurosamente la dosificación indicada por su médico.

Dada la elevada velocidad de multiplicación del virus, cualquier período sin niveles adecuados del fármaco podría condicionar la aparición de resistencias y comprometer su eficacia.

¿Cómo se conserva?

A temperatura ambiente, alejado de la humedad, del calor y la luz.

Efectos secundarios

Este medicamento puede producir: náuseas, vómitos, diarrea, dolor de cabeza, hiperglucemia, anemia, disminución de la libido, trastornos del sueño, parestesia, neuropatía periférica, vértigo, dolor de cabeza y dolor abdominal.

Comuníquese a su médico o farmacéutico cualquier otro síntoma que crea pueda ser debido a este medicamento.

Interacciones

Evite el uso conjunto con medicamentos como amiodarona, cisaprida, ergotamina y derivados, diazepam, flecainida, lovastatina, midazolam, pimizida, propafenona, terfenadina, triazolam, rifampicina y simvastatina o productos que contengan *Hypericum perforatum* (Hierba de San Juan).

Puede disminuir la eficacia de metadona (considerar aumentar la dosis).

Extremar la precaución si se usa junto a sildenafil, tadalafilo o vardafilo (puede potenciar sus efectos adversos).

Este medicamento, si se toma junto a determinados fármacos, puede aumentar su toxicidad o disminuir su eficacia. Por esto, es importante que antes de tomar otros medicamentos consulte a su médico o farmacéutico.

Otras observaciones

Advierta a su médico si tiene antecedentes de enfermedad hepática, diabetes o de reacción alérgica a saquinavir.