

Reyataz® (atazanavir)

¿Qué es?

Reyataz® es atazanavir, un inhibidor de la proteasa que disminuye la multiplicación del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH).

Se utiliza siempre en asociación con otros medicamentos antirretrovirales.

Aunque retrasa la progresión de la enfermedad, no evita el riesgo de transmisión de la infección, por ello debe tomar las precauciones necesarias para evitar contagiar a otras personas.

¿Cómo se administra?

Con comida o dentro de las 2 horas posteriores a la comida y siempre junto a Norvir® (ritonavir). Las cápsulas deben tragarse enteras, sin abrir.

Si toma antiácidos, administrar 2 horas antes ó 1 hora después de atazanavir/ritonavir.

Si toma antagonistas de receptores H2 (cimetidina, famotidina, ranitidina), administrar atazanavir/ritonavir 2 horas antes ó 10 horas después.

Cumpla rigurosamente la dosificación indicada por su médico.

¿Cómo se conserva?

A temperatura ambiente, alejado de la humedad, del calor y la luz.



Efectos secundarios

Este medicamento puede producir: náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal o de cabeza, fatiga, ictericia (color amarillento en piel y ojos), alteraciones de lípidos en sangre y erupción cutánea. Algunos síntomas suelen mejorar al cabo de unas semanas de tratamiento; si persisten o se agravan comuníquelo a su médico.

Su uso a largo plazo puede producir una distribución anormal de la grasa corporal (lipodistrofia).

Comuníquelo a su médico o farmacéutico cualquier otro síntoma que crea pueda ser debido a este medicamento.

Interacciones

Evitar su uso junto a cisaprida, ergotamina y derivados, esomeprazol, fluticasona, indinavir, lansoprazol, lovastatina, midazolam, ne-

virapina, omeprazol, pantoprazol, pimizida, quinidina, rifampicina, simvastatina, terfenadina, triazolam o productos con Hypericum perforatum (Hierba de San Juan).

Puede disminuir la eficacia de anticonceptivos orales. (usar métodos alternativos).

Extremar la precaución si se usa junto a amiodarona, atorvastatina, buprenorfina, ciclosporina, claritromicina, diltiazem, efavirenz, itraconazol, ketoconazol, rifabutin, sildenafil, sirolimus, tacrolimus, tadalafilo, vardenafilo, voriconazol, verapamilo y warfarina, puede ser necesario un ajuste de dosis.

Otras observaciones

Advierta a su médico si tiene antecedentes de enfermedad hepática, cardíaca, diabetes, hemofilia o reacción alérgica a atazanavir o alguno de sus excipientes.