

# Rebetol® (ribavirina)

## ¿Qué es?

Rebetol® es ribavirina, un antivírico que inhibe la multiplicación del virus de la hepatitis C. Se utiliza combinado con peginterferón alfa para el tratamiento de la hepatitis C crónica.

## ¿Cómo se administra?

Con alimentos o dentro de las 2 horas tras el desayuno y la cena. Se favorece la absorción del medicamento.

Las cápsulas deben tragarse enteras, sin abrir.

Si olvida tomar una dosis, tómela tan pronto pueda, si han pasado más de 6 horas, espere a la siguiente dosis. No tome una dosis doble para compensar la olvidada.

Cumpla rigurosamente la dosificación indicada por su médico.

Dada la elevada velocidad de multiplicación del virus, cualquier período sin niveles adecuados del fármaco podría condicionar la aparición de resistencias y comprometer su eficacia.

## ¿Cómo se conserva?

A temperatura ambiente, alejado de la humedad, del calor y la luz.

## Efectos secundarios

Este medicamento puede producir: cambios de humor (irritabilidad, depresión), insomnio, cansancio, dolor de cabeza, debilidad, dolor de estómago, náuseas, vómitos, pérdida de apetito y peso, diarrea o heces blandas, sequedad de boca o de piel, prurito, anemia, caída de pelo. Algunos síntomas suelen mejorar al cabo de unas semanas de tratamiento; si persisten o se agravan comuníquelo a su médico.

Contacte inmediatamente con su médico si aparece tos, fiebre y problemas al respirar, hematomas o sangrado, depresión o pensamientos suicidas, cambios en el ritmo cardíaco, trastornos visuales o de audición, o sarpullido generalizado.

## Interacciones

Evitar su uso junto a didanosina, puede aumentar el riesgo de acidosis láctica y pancreatitis.

Comuníquelo a su médico si está en tratamiento con otros inhibidores de la transcriptasa inversa (abacavir, estavudina, lamivudina, zalcitabina, zidovudina).

Este medicamento, si se toma junto a determinados fármacos, puede aumentar su toxicidad o disminuir su eficacia. Por esto, es importante que antes de tomar otros medicamentos consulte a su médico o farmacéutico.

## Otras observaciones

Informe a su médico antes de tomar este medicamento si tiene antecedentes de anemia hemolítica,

enfermedad cardiovascular o autoinmune, enfermedad psiquiátrica grave o problemas de tiroides.

### En el embarazo

Este medicamento puede causar malformaciones al feto:

- Si es mujer, evite el embarazo durante el tratamiento y hasta 4 meses después de terminarlo con medidas anticonceptivas eficaces.
- Si es varón, utilice usted y su pareja un método anticonceptivo eficaz durante y hasta 7 meses después de finalizar el tratamiento. No tenga relaciones sexuales con una mujer embarazada sin utilizar un condón.

Confirmar un resultado negativo en el test de embarazo antes del tratamiento y mensualmente.