

Sebivo® (telbivudina)

¿Qué es?

Sebivo® es telbivudina, un agente antiviral que se utiliza para tratar la infección crónica por el virus de la hepatitis B. Reduce la cantidad de virus en su organismo y, por tanto, disminuye el daño hepático y mejora el funcionamiento de su hígado.

El tratamiento con telbivudina no ha demostrado reducir el riesgo de transmisión del virus de la hepatitis B por contacto sexual o contaminación sanguínea, por lo que se deben tomar las precauciones apropiadas para evitarlo.

Existe una vacuna eficaz para proteger a aquellos con riesgo de infección con el virus de la hepatitis B.



¿Cómo se administra?

La pauta habitual es de un comprimido (600 mg) una vez al día.

Puede tomarlo con o sin comida. Tráguelo entero con un poco de agua. No lo mastique, divida ni triture.

Si olvida tomar una dosis, tómela tan pronto como pueda y después continúe como antes. Si han pasado más de 12 horas, espere a la siguiente dosis. No tome una dosis doble para compensar la olvidada.

Cumpla rigurosamente la dosificación indicada por su médico. No deje de tomar Sebivo® por su cuenta, su hepatitis podría empeorar o aparecer resistencias.

¿Cómo se conserva?

A temperatura ambiente, no más de 30°C, alejado de la humedad, del calor y la luz.

Efectos secundarios

Este medicamento puede producir: mareo, dolor de cabeza, tos, diarrea, náuseas, dolor abdominal y cansancio.

Contacte lo antes posible con su médico:

- Si presenta cualquiera de los siguientes síntomas que pudieran indicar una reacción alérgica:
 - “Pitos” repentinos y dolor u opresión en el pecho.
 - Hinchazón de los párpados, cara o labios.
 - Erupción cutánea en cualquier parte del cuerpo.
- Si presenta los siguientes síntomas que pudieran indicar una posible acidosis láctica: náuseas, vómitos, dolor abdominal, pérdida de apetito o de peso, respiración profunda o debilidad muscular.
- Si presenta ictericia (color amarillento en ojos o piel).
- Si presenta dolor muscular o debilidad muscular persistente.
- Si presenta adormecimiento, hormigueo, dolor y/o sensación de quemazón en brazos y/o piernas.

Comuníquese a su médico o farmacéutico cualquier otro síntoma que crea pueda ser debido a este medicamento.

Interacciones

Este medicamento, si se toma junto a determinados fármacos, puede aumentar su toxicidad o disminuir su eficacia. Por esto, es importante que antes de tomar otros medicamentos consulte a su médico o farmacéutico.

Otras observaciones

Advierta a su médico si es alérgico a telbivudina o a cualquiera de sus componentes, si tiene algún problema de riñón, si está infectado también por el VIH o si está embarazada o tiene planes de estarlo pronto.

No se recomienda la lactancia materna, se desconoce si telbivudina pasa a la leche materna, pero el virus de la hepatitis B sí puede pasar.