

# Rebif® (interferón beta-1a)

## ¿Qué es?

Rebif® es interferón beta-1a, una proteína que actúa regulando el sistema inmunitario para impedir que lesione la mielina y reducir la frecuencia y/o gravedad de las recaídas en pacientes con esclerosis múltiple remitente-recidivante y secundaria progresiva.

## ¿Cómo se administra?

Este medicamento se administra por vía subcutánea, en el tejido justo debajo de la piel.

Las zonas de inyección más adecuadas son: parte posterior de los brazos, abdomen (excepto cintura y ombligo), en nalgas y parte exterior de los muslos.

Debe sacarlo del frigorífico unos 30 minutos antes de la administración para que alcance la temperatura ambiente.

## ¿Cómo se conserva?

Debe guardarlo en nevera (2-8°C), en su caja original. NO en el congelador.

Conservarlo en el embalaje original para protegerlo de la luz.

No utilice Rebif si observa algún signo visible de deterioro.

## Efectos secundarios

Lugar de inyección: hinchazón, dolor, enrojecimiento.

Síntomas gripales: fiebre, escalofríos, dolor muscular, malestar general. Tome paracetamol 0,5-1 gramos media hora antes de la dosis y cada 6-8 horas en las siguientes 24-48 horas.

Contacte inmediatamente con su médico si: siente picor por el cuerpo, hinchazón de cara y/o lengua o dificultad al respirar, se siente más triste o tiene ideas de suicidio, aparecen cardenales, sangra con facilidad, contrae muchas infecciones, pérdida de apetito, náuseas o vómitos repetidos, color amarillento en piel u ojos, aceleración en los latidos de corazón, hinchazón en tobillos o piernas, dolor en el vientre que se extiende hacia la espalda, mareos o fiebre.

## Interacciones

Avise a su médico o farmacéutico si debe iniciar tratamiento con antiepilépticos o antidepresivos.

## Otras observaciones

Si se olvida una dosis: Adminístrese la siguiente dosis el día en que le toque la siguiente inyección. No use una dosis doble para compensar la dosis olvidada.

Alterne las zonas de inyección, para evitar los efectos secundarios locales. Las reacciones en el lugar de inyección pueden reducirse si se usa un autoinyector.

Masajee suavemente la zona después de la inyección. En caso de sangrado leve, no masajee y aplique presión en la zona.

En mujeres en edad fértil, utilizar método anticonceptivo.