

Betaferon® (interferón beta-1b)

¿Qué es?

Betaferon® es interferón beta-1b, una proteína que actúa regulando el sistema inmunitario para impedir que lesione la mielina y reducir la frecuencia y/o gravedad de las recaídas en pacientes con esclerosis múltiple remitente-recidivante, secundaria progresiva o en pacientes con un único acontecimiento desmielinizante grave.

¿Cómo se administra?

Este medicamento se administra por vía subcutánea, en el tejido justo debajo de la piel.

Las zonas de inyección más adecuadas son: parte posterior de los brazos, abdomen (excepto cintura y ombligo), en nalgas y parte superior de los muslos.

¿Cómo se conserva?

A temperatura ambiente a menos de 25° C. NO congelar.

El vial reconstituido es estable durante 3 horas en la nevera.

Observar visualmente la solución reconstituida antes de su empleo, y desecharla si contiene partículas o está coloreada.

Efectos secundarios

Lugar de inyección: hinchazón, dolor, enrojecimiento.

Síntomas gripales: fiebre, escalofríos, dolor muscular, malestar general. Tome paracetamol 0,5-1 gramos media hora antes de la dosis y cada 6-8 horas en las siguientes 24-48 horas.

Contacte inmediatamente con su médico si: siente picor por el cuerpo, hinchazón de cara y/o lengua, dificultad al respirar, se siente más triste o tiene ideas de suicidio, aparecen cardenales, sangra con facilidad, contrae muchas infecciones, pérdida de apetito, náuseas, vómitos repetidos, color amarillento en piel u ojos, aceleración en los latidos de corazón, hinchazón en tobillos o piernas, mareos o fiebre.

Interacciones

Avise a su médico o farmacéutico si debe iniciar tratamiento con cualquier medicamento.

Otras observaciones

Si se olvida una dosis: Póngasela tan pronto como sea posible. No use una dosis doble para compensar la dosis olvidada. La siguiente dosis deberá administrarse 48 horas después de ésta última.

Alterne las zonas de inyección, para evitar los efectos secundarios locales. Las reacciones en el lugar de inyección pueden reducirse si se usa un autoinyector.

Masajee suavemente la zona después de la inyección. En caso de sangrado leve, no masajee y aplique presión en la zona.

Evite la exposición directa al sol de la zona inmediatamente después de la inyección.

En mujeres en edad fértil, utilizar método anticonceptivo.