

Copaxone® (acetato de glatirámero)



¿Qué es?

Copaxone® es acetato de glatirámero, una proteína que simula los efectos de la proteína base de la mielina, indicado para reducir la frecuencia y/o gravedad de las recaídas en pacientes con esclerosis múltiple remitente-recidivante.

¿Cómo se administra?

Este medicamento se administra por vía subcutánea, en el tejido justo debajo de la piel.

Las zonas de inyección más adecuadas son: la parte posterior de los brazos, abdomen (excepto cintura y ombligo), en la zona glútea y la parte superior de los muslos.

Debe sacarlo del frigorífico unos 30 minutos antes de la administración para que alcance la temperatura ambiente.

¿Cómo se conserva?

Debe guardarlo en nevera, en su caja original. NO en el congelador.

Copaxone® puede mantenerse fuera de la nevera durante un máximo de 30 días. Una vez fuera de la nevera no volver a refrigerar.

Efectos secundarios

Reacciones en la zona de inyección como: dolor, enrojecimiento, inflamación y endurecimiento. Se puede aplicar frío en la zona. Estas reacciones suelen reducirse con el tiempo.

Poco después de la inyección, puede experimentar reacciones como: rubor en la cara, sensación de opresión en el pecho, respiración entrecortada, palpitaciones. Estos síntomas no suelen causar problemas, normalmente desaparecen al cabo de media hora. Se

recomienda acudir a Urgencias si los síntomas continúan pasados treinta minutos.

Contacte inmediatamente con su médico si aparece sarpullido (manchas rojas o ronchas), inflamación de los párpados, la cara o los labios, repentina dificultad para respirar, convulsiones o desfallecimiento.

Interacciones

Avise a su médico o farmacéutico si debe iniciar tratamiento con anti-epilépticos.

Otras observaciones

Si se olvida una dosis: póngasela tan pronto como sea posible, siempre 12 horas antes de la si-

guiente dosis. No use una dosis doble para compensar la dosis olvidada.

Alterne las zonas de inyección, para evitar los efectos secundarios locales. NO utilizar alcohol para desinfectar la zona de inyección.

No realizar masaje tras la inyección para evitar la aparición de hematoma.

En caso de leve sangrado por perforación de capilares, presionar suavemente durante unos segundos.

No utilizar en caso de alergia al medicamento o a manitol.

En mujeres en edad fértil, utilizar método anticonceptivo.