

Tysabri® (natalizumab)

¿Qué es?

Tysabri® es natalizumab, un anticuerpo producido por tecnología de DNA recombinante que se usa para tratar la esclerosis múltiple remitente-recidivante.

Impide que las células que causan inflamación se desplacen al cerebro, esto reduce la lesión nerviosa causada por la enfermedad. Tysabri® no repara las lesiones ya existentes causadas por la esclerosis múltiple.

¿Cómo se administra?

Este medicamento se administra por vía intravenosa, por personal sanitario cualificado en el Hospital de Día, durante 1 hora. Deberá permanecer en observación 1 hora

después de finalizada la perfusión con el fin de detectar posibles reacciones (erupción con picor, hinchazón de cara, labios o lengua o dificultad para respirar). Luego podrá irse a su casa.

El tratamiento se administra cada 4 semanas.

Efectos secundarios

Pueden producirse infecciones graves con Tysabri®, sus síntomas incluyen: fiebre inexplicable, diarrea grave, falta de aliento, mareo prolongado, dolor de cabeza, rigidez del cuello, pérdida de peso o falta de energía.

Se pueden producir: infecciones urinarias, inflamación de garganta y congestión o secreción de nariz,

escalofríos, picor en la piel, dolor de cabeza, mareos, náuseas, vómitos, dolor articular, fiebre y cansancio.

Pueden producirse alteraciones en el hígado durante el tratamiento, su médico realizará pruebas de función hepática para detectarlas. Informe a su médico si presenta coloración amarilla en la piel ó vómitos.

Interacciones

Avise a su médico o farmacéutico si debe iniciar cualquier tratamiento con medicamentos.

Otras observaciones

En mujeres en edad fértil, utilizar método anticonceptivo.

¿Tysabri® funciona siempre?

En un reducido número de pacientes que usan Tysabri®, las defensas naturales del cuerpo pueden, con el tiempo, impedir que el medicamento funcione adecuadamente (el cuerpo desarrolla anticuerpos contra el fármaco). Su médico puede determinar si Tysabri® no está funcionando adecuadamente mediante análisis de sangre y si es necesario, suspenderá el tratamiento.

¿Qué hacer si no se administró una dosis?

Si no recibió su dosis habitual de Tysabri®, hable con su médico para que se la administre lo antes posible. Después, puede seguir recibiendo Tysabri® cada 4 semanas.