

Rilutek® (riluzol)

¿Qué es?

Rilutek® contiene riluzol, un fármaco que actúa sobre el sistema nervioso, por inhibición de la liberación de glutamato, un neurotransmisor. Retarda la progresión de la esclerosis lateral amiotrófica, pero no la cura.

Se presenta en envases con 56 comprimidos de 50mg.

¿Cómo se administra?

Este medicamento se administra por vía oral. Rilutek® puede tomarse con o sin alimentos, aunque separado de la administración de alimentos grasos. Trague el comprimido entero con un vaso de agua. Procure tomarlo siempre a la misma hora. La dosis diaria habitualmente recomendada es de un comprimido de 50mg dos veces al día (mañana y noche).

¿Cómo se conserva?

Rilutek® no precisa condiciones especiales de conservación. Guárdelo a temperatura ambiente, lejos del calor excesivo y de la humedad (no en el baño).

Efectos secundarios

Rilutek® puede producir: náuseas, cansancio, dolor de cabeza y alteración de las pruebas de función hepática.

Rilutek® puede afectar a la capacidad de su cuerpo de combatir infecciones. Si tiene cualquier signo de enfermedad, especialmente fiebre, comuníquese inmediatamente al médico.

Interacciones

Avise a su médico o farmacéutico si debe iniciar tratamiento con antiepilépticos o antidepresivos.

Otras observaciones

Si olvida tomar un comprimido, no tome una dosis doble; espere a la siguiente hora de administración para seguir su pauta habitual.

NO abuse de productos que contengan cafeína, (café, té, bebidas de cola o chocolate).

NO abuse del alcohol (aumenta la somnolencia y afecta a su función hepática).