

Remicade® (infiximab)

¿Qué es?

Remicade® es Infiximab, un fármaco que bloquea la acción de factor de necrosis tumoral, proteína que participa en procesos de inflamación e inmunidad de nuestro cuerpo. Infiximab reduce la inflamación asociada a enfermedades crónicas como la artritis reumatoide, artritis psoriásica, espondilitis anquilosante, psoriasis y enfermedad de Crohn.

Puede disminuir la actividad del sistema inmune haciéndolo más susceptible a infecciones y otras enfermedades

Antes de utilizar Remicade® informe a su médico si tiene historial de infecciones recurrentes, crónicas o localizadas, si ha tenido tuberculosis o ha estado en contacto con algún caso, si padece diabetes, insuficiencia cardíaca moderada o grave, esclerosis múltiple o neuritis óptica, si le van a realizar una intervención quirúrgica o dental, o si es portador del virus de la hepatitis B.

¿Cómo se administra?

Remicade® se lo administrará personal sanitario cualificado, por vía intravenosa, en un Hospital de Día.

La administración durará aproximadamente 2-3 horas. Previamente le administrarán algunos fármacos para prevenir posibles efectos adversos derivados de la infusión, posteriormente estará 1-2 horas en observación en el hospital de día para comprobar que la administración no ha dado problemas.

El tratamiento comienza con 3 dosis: la inicial y a las 2 y 6 semanas después de ésta. Si hay respuesta y buena tolerancia, se continuará el tratamiento con una administración cada 6-8 semanas.

¿Cómo se conserva?

Debe guardar este medicamento en la nevera (2-8°C), en su caja original. NO en el congelador.

Efectos secundarios

Remicade® puede aumentar el riesgo de contraer infecciones (resfriado, sinusitis, bronquitis, infecciones del tracto urinario o de la piel, etc).

Contacte inmediatamente con su médico si aparece erupción cutánea, urticaria, si presenta dificultad para respirar o tragar, hinchazón de la cara, manos o pies, baja pre-

sión arterial (posible reacción alérgica- puede aparecer hasta 12 días después de la infusión-), fiebre alta con tos o falta de aliento (posible neumonía), hemorragia o hematomas, entumecimiento u hormigueo (posible neuropatía), visión doble o alteraciones de la visión, tos persistente, pérdida de peso y/o febrícula (posible tuberculosis), o signos de otras infecciones (dentales, de piel o si sensación de quemazón al orinar, dificultad al respirar durante el ejercicio o al tumbarse, o hinchazón de los pies (aparición o empeoramiento de insuficiencia cardíaca)

Durante la infusión o 1-2 horas después pueden aparecer reacciones adversas derivadas de la misma como dolor de cabeza, mareo, dolor abdominal, diarrea, náuseas, aumento de la sudoración cutánea, urticaria, fatiga, y/o bajada de presión arterial. Para prevenirlas o minimizarlas le podrán administrar algunos fármacos.

Comuníquese a su médico o farmacéutico otros síntomas que asocie a infiximab, y antes de tomar otros medicamentos, infórmele.

Interacciones

Informe a su médico que está en tratamiento con Remicade® antes de ponerse cualquier vacuna.

Otras observaciones

Es recomendable la vacunación frente al neumococo y la gripe. Se recomienda que los pacientes pediátricos lleven al día todas las vacunas correspondientes al calendario de vacunación antes de iniciar el tratamiento con Remicade®.

Remicade NO puede administrarse en el embarazo. Las mujeres en edad fértil deberán utilizar un método anticonceptivo adecuado durante el tratamiento con este fármaco y hasta 5 meses después de haberlo suspendido.

Tanto los hombres como las mujeres en tratamiento con Remicade® y Metotrexato deberán utilizar un método anticonceptivo eficaz durante el tratamiento y hasta 6 meses después de haberlo finalizado.

Es recomendable evitar la lactancia materna durante el tratamiento con Remicade®.