Aranesp® (darbepoetin alfa)

medicamentos de hospital

¿Qué es?

La darbepoetina es una proteína análoga a la hormona natural humana , que incrementa la hemoglobina y el número de glóbulos rojos (hematocrito) y se utiliza para tratar la anemia asociada a enfermedades renales y la anemia asociada a quimioterapia y tumores sólidos.

Se presenta como una solución inyectable en una jeringa precargada o en forma de pluma para su inyección subcutánea.

¿Cómo se administra?

La darbepoetina se administra por vía intravenosa o subcutánea es decir, en el tejido que está debajo de la piel. No debe pincharse en el músculo, ni en las venas. Puede administrárselo usted mismo. Su médico le ha indicado la dosis, la vía y la duración de su tratamiento con Aranesp®, siga sus instrucciones.

Elija una zona para la inyección entre las siguientes:

- parte posterior de los brazos,
- abdomen (excepto cintura y ombligo) y
- parte superior de los muslos.



Para evitar irritación en el punto de inyección, procure alternar el lugar de inyección

Saque el medicamento del frigorífico unos minutos antes de administrarlo hasta que alcance la temperatura ambiente (15-30 min).

Busque una superficie cómoda, limpia y bien iluminada y coloque todo el material que necesite a su alcance.

Lávese las manos antes de comenzar.

Compruebe que el líquido sea claro, sin cambios de color ni partículas visibles.

Retire el protector de la jeringa.

Desinfecte la piel en el lugar de inyección con un algodón empapado en alcohol.

Forme un pliegue cutáneo con los dedos pulgar e índice, sin apretar.

Sujete la jeringa por la parte más próxima a la aguja e inserte la aguja en el pliegue cutáneo formando un ángulo de 45º con acción firme y rápida. Tire un poco del émbolo para atrás, si se viera sangre en la jeringa, sacar la aguja y pinchar en otro punto.

Inyecte el líquido despacio manteniendo el pliegue cutáneo y al finalizar, retire la aguja y suelte el pliegue.

Aplique presión ligeramente sobre el lugar de inyección con un algodón.

Deseche la jeringa en un recipiente rígido para evitar pinchazos accidentales.

¿Cómo se conserva?

A temperatura ambiente a menos de 25º C. NO congelar.

El vial reconstituido es estable durante 3 horas en la nevera.

Efectos secundarios

Lugar de inyección: hinchazón, dolor, enrojecimiento.

Síntomas gripales: fiebre, escalofríos, dolor muscular, malestar general. Tome paracetamol 0,5-1 gramos media hora antes de la dosis y cada 6-8 horas en las siguientes 24-48 horas.

Contacte inmediatamente con su médico si: siente picor por el cuerpo, hinchazón de cara y/o lengua o dificultad al respirar, se siente más triste o tiene ideas de suicidio, aparecen cardenales, sangra con facilidad o contrae muchas infecciones, pérdida de apetito, náuseas o vómitos repetidos o color amarillento en piel u ojos, aceleración en los latidos de corazón, hinchazón en tobillos o piernas o dificultad al respirar, dolor en el vientre que se extiende hacia la espalda, mareos o fiebre.

Interacciones

Avise a su médico o farmacéutico si debe iniciar tratamiento con cualquier medicamento.

Otras observaciones

Si se olvida una dosis: Póngasela tan pronto como sea posible. No use una dosis doble para compensar la dosis olvidada. La siguiente dosis deberá administrarse 48 horas después de ésta última.

Alterne las zonas de inyección, para evitar los efectos secundarios locales. Las reacciones en el lugar de inyección pueden reducirse si se usa un autoinyector.

Masajee suavemente la zona después de la inyección. En caso de sangrado leve, no masajee y aplique presión en la zona.

Evite la exposición directa al sol de la zona inmediatamente después de la inyección.

En mujeres en edad fértil, utilizar método anticonceptivo.

Más información sobre sus medicamentos en **www. medicamentosdehospital.es**