

# Aranesp® sureclick™ (darbepoetin alfa)

## ¿Qué es?

La darbepoetina es una proteína análoga a la hormona natural humana, que incrementa la hemoglobina y el número de glóbulos rojos (hematocrito) y se utiliza para tratar la anemia asociada a enfermedades renales y la anemia asociada a quimioterapia y tumores sólidos.


Se presenta como una solución inyectable en una jeringa precargada o en forma de pluma para su inyección subcutánea.

## ¿Cómo se administra?

La darbepoetina se administra por vía intravenosa o subcutánea es decir, en el tejido que está debajo de la piel. No debe pincharse en el músculo, ni en las venas. Puede administrárselo usted mismo. Su médico le ha indicado la dosis, la vía y la duración de su tratamiento con Aranesp® sureclick™, siga sus instrucciones.

Elija una zona para la inyección entre las siguientes:

- parte posterior de los brazos,
- abdomen (excepto cintura y ombligo) y
- parte superior de los muslos.



Para evitar irritación en el punto de inyección, procure alternar el lugar de inyección-


Saque el medicamento del frigorífico unos minutos antes de administrarlo hasta que alcance la temperatura ambiente (15-30 min).

Busque una superficie cómoda, limpia y bien iluminada y coloque todo el material que necesite a su alcance.


Lávese las manos antes de comenzar.

Compruebe que el líquido sea claro, sin cambios de color ni partículas visibles.

1. Desinfecte el lugar de inyección.




2. Quite el tapón gris.




3. Sujete la pluma como en la figura.



4. Forme un ángulo de 90 grados con la piel y sujete la pluma firmemente contra la superficie de la piel para desbloquear el protector de seguridad.



5. Presione el botón de carga de la pluma con el dedo pulgar suavemente y suéltelo sin levantar la pluma durante todo el proceso. Oirá el primer CLICK.



6. Cuente 15 segundos y la inyección se habrá completado

7. Espere a que la inyección haya finalizado antes de levantar la pluma precargada de la zona de inyección. (Es posible que oiga un segundo click cuando el botón rojo vuelva a su posición inicial).



## ¿Cómo se conserva?

Manténgalo en la nevera. Nunca en el congelador. Utilice una bolsa isotérmica para su transporte. Recuerde que se conserva un máximo de 60 minutos a temperatura ambiente (máximo 25°C).

## Efectos secundarios

Es un medicamento muy bien tolerado y entre sus efectos adversos destacan:

Aumento de la tensión arterial, dolor o irritación en el punto de inyección, Eritema, erupción en la piel y tejido subcutáneo, síntomas gripales, dolor de cabeza, náuseas, vómitos, diarrea, dolores articulares y aplasia pura de células rojas mediada por anticuerpos y asociada fundamentalmente a pacientes con insuficiencia renal crónica y administración de darbepoetina por vía subcutánea.

Si durante el tratamiento sufre un dolor de cabeza repentino y punzante, confusión o convulsiones, dolor en el pecho, palpitaciones, problemas para respirar o sarpullido generalizado consulte inmediatamente con su médico.

Si aparecen efectos adversos, aunque no estén mencionados en el prospecto o en ésta hoja informativa, debe comunicárselo a su médico.

Si aparece algún efecto adverso comuníquese a su médico.

## Interacciones

Existe la posibilidad de interacción con ciclosporina y tacrolimo, ya que se unen a los glóbulos rojos este medicamento por ello se deberán controlar los niveles de ciclosporina y tacrolimo en sangre y se ajustará la dosis de los mismos a medida que aumenta la hemoglobina.

Más información sobre sus medicamentos en [www.medicamentosdehospital.es](http://www.medicamentosdehospital.es)

## Otras observaciones

### ¿Qué hacer ante el olvido de una dosis?

Si se olvida una dosis, póngasela tan pronto como sea posible. No use una dosis doble para compensar la dosis olvidada.

### ¿Que debe decirle a su médico antes de empezar el tratamiento?

Informe a su médico si:

- está embarazada ó da de mamar a su hijo.
- toma otros medicamentos
- padece hipertensión arterial mal controlada
- Tiene ó ha padecido otras enfermedades sobre todo de tipo cardiovascular
- Si tiene historial de alergia.

Recuerde que puede solicitar que se le administre el medicamento en su centro de salud.

Tome su medicamento exactamente como le ha indicado su médico.

Este medicamento se le ha prescrito a usted personalmente y no debe ser utilizado por otras personas aunque tengan los mismos síntomas.

Consulte con su médico o farmacéutico antes de tomar otros medicamentos

Mantenga sus medicamentos fuera del alcance de los niños.

NO utilice este medicamento una vez superada la fecha de caducidad (último día del mes indicado en el envase).