

Neorecormon[®] (eritropoyetina beta)

¿Qué es?

La eritropoyetina beta (EPO) es una proteína análoga a la hormona natural humana, que incrementa la hemoglobina y el número de glóbulos rojos (hematocrito) y se utiliza para tratar la anemia asociada a enfermedades renales y la anemia asociada a quimioterapia y tumores sólidos.

Se presenta como una solución inyectable en una jeringa precargada para inyección subcutánea.

¿Cómo se administra?


La EPO beta se administra por vía intravenosa o subcutánea es decir, en el tejido que está debajo de la piel. No debe pincharse en el músculo, ni en las venas. Puede administrárselo usted mismo. Su médico le ha indicado la dosis, la vía y la duración de su tratamiento con EPO, siga sus instrucciones.

Elija una zona para la inyección entre las siguientes:

- parte posterior de los brazos,
- abdomen (excepto cintura y ombligo) y
- parte superior de los muslos.

Para evitar irritación en el punto de inyección, procure alternar el lugar de inyección

Saque el medicamento del frigorífico unos minutos antes de administrarlo hasta que alcance la temperatura ambiente (15-30 min).



Lávese las manos antes de comenzar.

Compruebe que el líquido sea claro, sin cambios de color ni partículas visibles.

Retire el protector de la jeringa. No es necesario que saque la pequeña burbuja de aire de la jeringa.

Desinfecte la piel en el lugar de inyección con un algodón empapado en alcohol.

Forme un pliegue cutáneo con los dedos pulgar e índice, sin apretar.

Sujete la jeringa por la parte más próxima a la aguja e inserte la aguja en el pliegue cutáneo formando un ángulo de 45° con acción firme y rápida.

Tire un poco del émbolo para atrás, si se viera sangre en la jeringa, sacar la aguja y pinchar en otro punto.

Inyecte el líquido despacio manteniendo el pliegue cutáneo y al finalizar, retire la aguja y suelte el pliegue.

Aplique presión ligeramente sobre el lugar de inyección con un algodón.

Deseche la jeringa en un recipiente rígido.


¿Cómo se conserva?

Mantenga este medicamento en su envase original, protegido de la luz y en la nevera (entre 2°C y 8°C). Nunca lo guarde en el congelador. NO AGITAR.

Como norma general intente que el tiempo de transporte desde el hospital al domicilio sea lo más corto posible y utilice una bolsa isotérmica.

Si por un descuido deja la jeringa fuera de la nevera, tenga en cuenta que se conserva un máximo de 60 minutos a temperatura ambiente (máximo 25°C)

Comunique con el Servicio de Farmacia de su



Hospital si se produce algún problema durante el almacenamiento antes de administrárselo.

Efectos secundarios

En general, la EPO beta es un medicamento muy bien tolerado y sus efectos adversos son poco frecuentes:

- Dolor o irritación en el punto de inyección. Para prevenirlo modifique frecuentemente el punto de inyección.
- Subidas de la tensión arterial
- Síntomas gripales, dolor de cabeza, náuseas, vómitos, diarrea, dolores articulares. Son más frecuentes al inicio del tratamiento. Consulte a su médico o farmacéutico si puede tomar tratamiento para estos síntomas.

Si durante su tratamiento con EPO beta sufre un dolor de cabeza repentino y punzante, confusión o convulsiones, dolor en el pecho, palpitaciones, problemas para respirar o sarpullido generalizado consulte inmediatamente con su médico.

Si aparecen efectos adversos, aunque no estén mencionados en el prospecto o en ésta hoja informativa, debe comunicárselo a su médico

Lo NORMAL es que no aparezca ninguno de estos efectos secundarios, si aparece alguno de ellos no se alarme y comuníquese a su médico. NO deje de tomar su medicación sin consultárselo previamente a su médico.

Interacciones

Existe la posibilidad de interacción con ciclosporina, ya que esta se une a los glóbulos rojos este medicamento por ello se deberán contro-

lar los niveles de ciclosporina en sangre y se ajustará la dosis de la ciclosporina a medida que aumenta el hematocrito.

Otras observaciones

¿Qué hacer ante el olvido de una dosis?

Si se olvida una dosis, póngasela tan pronto como sea posible. No use una dosis doble para compensar la dosis olvidada.

¿Que debe decirle a su médico antes de empezar el tratamiento?

Informe a su médico si:

- Está embarazada ó da de mamar a su hijo.
- Toma otros medicamentos.
- Padece hipertensión arterial mal controlada.
- Tiene ó ha padecido otras enfermedades sobre todo de tipo cardiovascular.
- Si tiene historial de alergia.

Recuerde que puede solicitar que se le administre el medicamento en su centro de salud.

Tome su medicamento exactamente como le ha indicado su médico.

Este medicamento se le ha prescrito a usted personalmente y no debe ser utilizado por otras personas aunque tengan los mismos síntomas

Consulte con su médico o farmacéutico antes de tomar otros medicamentos

Mantenga sus medicamentos fuera del alcance de los niños.

NO utilice este medicamento una vez superada la fecha de caducidad (último día del mes indicado en el envase).